

Pre-Gravidanza	Entro la 13° settimana Terzo mese	Entro la 18° settimana Quarto Mese	Entro la 23° settimana Quinto Mese	Entro la 27° settimana Sesto Mese	Entro la 32° settimana Settimo Mese	Entro la 37° settimana Ottavo Mese	Entro la 40° settimana Nono Mese
Consulenza Ginecologica	Citomegalovirus IgG e Igm	Emocromo	Emocromo	Minicurva da carico glicemico	Esami previsti per mancata protezione (Toxoplasma, Rosolia, CMV)	Test di Coombs Indiretto (se RH Negativo)	Cardiotocografia
Anticorpi Virus Rosolia	Parametri ematocoagulativi (PT, PTT, INR, ATII)	Urinocoltura	Test di Coombs Indiretto (se RH Negativo)	Misurazione della pressione arteriosa e del peso corporeo	Flussimetria doppler delle arterie ombelicali	Esami previsti per mancata protezione (Toxoplasma, Rosolia, CMV)	Controllo liquido amniotico (Indice del fluido amniotico o diametro sacca principale del liquido)
Anticorpi Toxoplasma	Gruppo Sanguigno (se non in possesso di tesserino)	Tampone vaginale (per ricerca Streptococco B, Candida, Clamydia, Mycoplasma)	IgG e IgM per Toxoplasma, Rosolia, CMV se negativi al controllo precedente		Misurazione della pressione arteriosa e del peso corporeo	Tampone vaginale e rettale (per ricerca Streptococco B, Clamydia, Mycoplasma)	Misurazione della pressione arteriosa e del peso corporeo
Test di Coombs Indiretto	HBSAg anticorpi anti HCV	Test di Coombs Indiretto (se RH Negativo)	Misurazione della pressione arteriosa e del peso corporeo			Elettrocardiogramma	
Emocromo	Elettroforesi dell'emoglobina	IgG e IgM per Toxoplasma, Rosolia, CMV se negativi al controllo precedente				Misurazione della pressione arteriosa e del peso corporeo	
Test di Simmel	Misurazione della pressione arteriosa e del peso corporeo	Misurazione della pressione arteriosa e del peso corporeo					
Emoglobine Anomale (HbS, HbH, HbD, ecc)	Ultrasceen (bi test + traslucenza nucale)	Tritest					
Pap Test	Villocentesi						
	Funzionalità Epatica (AST, ALT, Bilirubinemia totale e diretta)						
	Virus Rosolia IgG e IgM						
	Toxoplasmosi IgG e IgM (in caso di IgG Negative ripetero l'esame mensilmente)						
Oltre la 40° settimana Termine Gravidanza	Circa il 10% delle gravidanza superano la 40° settimana, questo protrarsi può determinare l'aumento del rischio di "Placenta invecchiata" e la diminuzione del liquido amniotico. Perciò, dopo il termine di 40 settimane, il monitoraggio della gestante e del feto diventa più frequente tramite CTG, visite ed ecografie (esenti dal pagamento se motivate da richiesta medica)						