

| Pre-Gravidanza | Entro la 13° settimana Terzo mese | Entro la 18° settimana Quarto Mese | Entro la 23° settimana Quinto Mese | Entro la 27° settimana Sesto Mese | Entro la 32° settimana Settimo Mese | Entro la 37° settimana Ottavo Mese | Entro la 40° settimana Nono Mese |
|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Consulenza Ginecologica | Citomegalovirus IgG e Igm | Emocromo | Emocromo | Minicurva da carico glicemico | Esami previsti per mancata protezione (Toxoplasma, Rosolia, CMV) | Test di Coombs Indiretto (se RH Negativo) | Cardiotocografia |
| Anticorpi Virus Rosolia | Parametri ematocoagulativi (PT, PTT, INR, ATII) | Urinocoltura | Test di Coombs Indiretto (se RH Negativo) | Misurazione della pressione arteriosa e del peso corporeo | Flussimetria doppler delle arterie ombelicali | Esami previsti per mancata protezione (Toxoplasma, Rosolia, CMV) | Controllo liquido amniotico (Indice del fluido amniotico o diametro sacca principale del liquido) |
| Anticorpi Toxoplasma | Gruppo Sanguigno (se non in possesso di tesserino) | Tampone vaginale (per ricerca Streptococco B, Candida, Clamydia, Mycoplasma) | IgG e IgM per Toxoplasma, Rosolia, CMV se negativi al controllo precedente | | Misurazione della pressione arteriosa e del peso corporeo | Tampone vaginale e rettale (per ricerca Streptococco B, Clamydia, Mycoplasma) | Misurazione della pressione arteriosa e del peso corporeo |
| Test di Coombs Indiretto | HBSAg anticorpi anti HCV | Test di Coombs Indiretto (se RH Negativo) | Misurazione della pressione arteriosa e del peso corporeo | | | Elettrocardiogramma | |
| Emocromo | Elettroforesi dell'emoglobina | IgG e IgM per Toxoplasma, Rosolia, CMV se negativi al controllo precedente | | | | Misurazione della pressione arteriosa e del peso corporeo | |
| Test di Simmel | Misurazione della pressione arteriosa e del peso corporeo | Misurazione della pressione arteriosa e del peso corporeo | | | | | |
| Emoglobine Anomale (HbS, HbH, HbD, ecc) | Ultrasceen (bi test + traslucenza nucale) | Tritest | | | | | |
| Pap Test | Villocentesi | | | | | | |
| | Funzionalità Epatica (AST, ALT, Bilirubinemia totale e diretta) | | | | | | |
| | Virus Rosolia IgG e IgM | | | | | | |
| | Toxoplasmosi IgG e IgM (in caso di IgG Negative ripetero l'esame mensilmente) | | | | | | |
| Oltre la 40° settimana Termine Gravidanza | Circa il 10% delle gravidanza superano la 40° settimana, questo protrarsi può determinare l'aumento del rischio di "Placenta invecchiata" e la diminuzione del liquido amniotico. Perciò, dopo il termine di 40 settimane, il monitoraggio della gestante e del feto diventa più frequente tramite CTG, visite ed ecografie (esenti dal pagamento se motivate da richiesta medica) | | | | | | |